

病 虫 情 报

第七期

平江县植保植检站

2026 年 8 月 7 日

切实抓好中晚稻当前病虫害防控、警惕飞虱 暴发成灾

一、当前病虫害发生情况

稻飞虱：受前期台风天气影响，稻飞虱多批次迁入，加之，今年早稻部分丘块飞虱防治效果较差，随着早稻收割，飞虱陆续迁入中晚稻田块，大暴发风险极高。从 8 月 1 日至 8 月 5 日，木金测报灯下稻飞虱累计诱虫量 4200 头，三市测报灯下 2200 头；8 月 6 日临田检查，木金乡木瓜村中稻丘块百蔸虫量 6000 头，木金乡大兴村丘块百蔸虫量 3500 头，虹桥镇洞口村坳上组丘块百蔸虫量 2600 头，三阳乡美源村丘块百蔸虫量 2500 头；后续受强对流天气（午后强降雨）影响，将有利于稻飞虱迁入；近段时间大部分再生稻陆续成熟收割，田间虫量还会增加，发生程度远超常年，防控形势十分严峻。

二化螟：8月4日至8月6日，伍市性诱测报灯下分别是13头、35头、47头，三市人工测报灯下分别9头、31头、23头，当前田间卵、幼虫、蛾混杂，发生参差不齐，世代重叠严重。

稻纵卷叶螟：多批迁入叠加本地虫源，人工测报灯下7月29日、8月1日、8月3日、8月5日分别是27头、14头、25头、23头，预计8月6日-12日进入卵孵高峰，田间虫态混杂，发生面广。

纹枯病：8月6日田间调查，一季稻田平均病蔸率20.5%，病株率3.5%。

二、防治意见

1. 防治时间：8月10日-16日

2. 防治对象：主治稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟、纹枯病、兼治稻瘟病、稻曲病、稻螟蛉，预防晚稻田南方水稻黑条矮缩病等。

3. 防治对象田块：一季中稻、一季晚稻田、晚稻田

4. 防治药剂

稻飞虱：三氟苯嘧啶、20%以上烯啶虫胺、80%烯啶·吡蚜酮，对于百丛量达到1000头以上的田块，要立即采用三氟苯嘧啶+敌敌畏，或者80%烯啶·吡蚜酮+90%敌敌畏混配，快速击毙高龄成虫、若虫、封杀虫卵，彻底压低基数。

二化螟和稻纵卷叶螟：5%以上阿维菌素、2%以上甲维盐、乙基多杀菌素与虱螨脲混用。

纹枯病、稻瘟病：选用肟菌·戊唑醇、丙环唑菌酯等。

三、注意事项

1. 施药时间：高温期间避开高温时段，在上午9点前和下午5点后作业，确保作业效果和人员安全。

2. 精准施药：稻飞虱集中栖自水稻基部茎秆之间，药液必须重点喷淋稻丛中下部，务必喷入稻丛株间，杜绝只喷叶面，敷衍施药。

3. 保证施药量：人工喷雾每亩兑水45-60公斤（即3至4背包水），无人机施药亩用水量不少于5升，配合使用有机硅、卵磷脂等农药助剂，足量打透、打湿、打匀，提高防效。

4. 保持田间水层：施药时田间3-5厘米浅水层，保水5-7天，提升药剂渗透，熏蒸效果。

5. 保持高度警惕：根据田间发生情况，禾苗生长情况，都具备稻飞虱大发生条件，各乡镇农技中心务必高度重视，密切关注稻飞虱田间发生动态，科学指导各种植主体开展科学防治，坚决遏制稻飞虱暴发成灾。

公益提示：

1. 融合推进统防统治和绿色防控，精准用药、提质增效。
2. 科学安全使用农药，注意农药使用安全间隔期。
3. 严格实施植物检疫，守好农业生物灾害防控第一关。