

病 虫 情 报

第八期

平江县植保植检站

2026 年 8 月 20 日

全力遏制飞虱暴发成灾、夺取秋粮丰收

一、当前病虫发生实况

稻飞虱：8 月 15 日至 8 月 19 日 木金测报灯，梅仙测报灯分别达到 11000 头，5821 头，其中 8 月 17 日单日达到 3800 头和 1454 头。田间调查，中稻田稻飞虱发生极不平衡，一般丘块百蔸虫量 700 头，严重丘块百蔸虫量达到 15000 头以上；晚稻田百蔸虫量 400 头；近期随着连续午后降雨，部分再生稻收获，大量成虫迁入晚稻田。加之，“盛夏不热，晚秋不凉”的有利气候，稻飞虱有大发生的态势。稻飞虱防控需坚持“压前控后，治早治小，分类施策”的原则，全力遏制稻飞虱暴发成灾。

稻纵卷叶螟：8 月 12 日至 8 月 19 日测报灯下有关数据如下

日期 数量 测报灯	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日
三市测报灯	43	48	54	156	247	308	218	255
木金测报灯	28	52	154	68	93	94	118	121
梅仙测报灯	10	8	18	17	24	24	46	58

由于受多轮台风影响，稻纵卷叶螟多批次迁入，当前中稻田间卵、幼虫、蛹、成虫大量并存，防控压力大，需选择长效药剂，并添加虱螨脲等杀卵活性高的药剂。

二化螟：由于第二代二化螟发育极不整齐，测报灯下这段时间又出现发蛾高峰。8月12日至8月19日，三市测报灯下分别是42头、32头、37头、58头、61头、59头、65头、76头。梅仙测报灯下分别是89头、28头、43头、71头、74头、60头、230头、224头。当前二化螟蛾峰期长，单、双季稻混栽区，虫口基数大，防治时要注意选择速效与持效药剂混合使用。

纹枯病：一季稻纹枯病进入流行期，平均病蔸率20%，严重丘块病蔸率50%，移栽早的晚稻田始见纹枯病。

稻瘟病：我县大部分一季稻正处于破口抽穗期，近段时间降雨频发，有利于稻瘟病的发生，各地需切实做好稻瘟病的预防工作。

二、防治意见

预计8月中下旬，稻飞虱田间虫量又将进入快速增殖期，

二化螟进入卵孵盛期，当前正值稻飞虱“压四控五”的关键节点，也是稻纵卷叶螟（保护功能叶）和三代二化螟的关键时期，各地务必高度重视严密防范“两迁”害虫暴发成灾，同时警惕三代二化螟为害造成白穗；要抓住防治适期，及时指导农户开展防治工作。

1. 防治适期：8月23日-30日

2. 防治对象田：一季稻田、双季晚稻田

3. 防治对象：主治稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、兼治纹枯病、稻瘟病、预防稻曲病。

4. 防治指标：稻飞虱百蔸500头以上；稻纵卷叶螟百蔸束叶尖150个以上，二化螟枯鞘株率达3%或枯鞘丛率达5%以上，纹枯病病蔸率20%以上，稻瘟病易感品种和老病区。

5. 防治药剂

稻飞虱：优先选用长效药剂三氟苯嘧啶，后期轮换选用氟啶虫胺腈、呋虫胺、烯啶虫胺等。

二化螟、稻纵卷叶螟：选用四唑虫酰胺、乙基多杀菌素、茚虫威、乙多·甲氧虫等，建议增加氟铃脲或虱螨脲等杀卵性较强的药剂。

纹枯病、稻曲病：选用噻呋酰胺、嘧菌酯（25%以上），氟环唑等。

稻瘟病：稻瘟灵、吡唑醚菌酯、春雷霉素（2%以上）等。

三、注意事项

1. 施药时，常规背负式喷雾器亩施药液用量30-45升，

植保无人机飞防每亩施药液量不少于 5 升，喷施时应重点对准稻株中下部，确保水稻中、下部充分着药。

2. 应合理选用对口药剂，并注意轮换交替使用，施药前田间灌水 3-5 厘米浅水层，施药后保水 5-7 天。

3. 要避开高温时段施药，宜于上午 9 点前或下午 5 点后作业，施药作业人员须严格按照操作规程做好安全防护。

公益提示：

1. 融合推进统防统治和绿色防控，精准用药、提质增效。
2. 科学安全使用农药，注意农药使用安全间隔期。
3. 严格实施植物检疫，守好农业生物灾害防控第一关。